

Test af taleforståelighed på sætningsniveau

MANUAL

Målgruppe:

Testen kan bruges til alle grader af dysartri. Når du anvender testen, skal du dog være opmærksom på, om der er andre faktorer som fx afasi, ordblindhed og/eller dialekt, der kan påvirke testens resultat.

Se vejledningen for yderligere beskrivelse af målgruppe.

Du skal bruge:

Et registreringsark

En sætningsliste

En telefon/diktafon til at optage højtlesningen på

Sådan anvendes TTS:

Testsituation

- Riv en sætningsliste ud af afrivningsblokken.
Kig ikke på sætningslisten, som står på bagsiden.
- Instruér borgeren i at læse én sætning højt ad gangen, når du har sagt sætningens nummer.
- Lad borgeren højt læse de to prøvesætninger på forsiden. Hvis der er rimelig taleforståelighed og borgeren afkoder sætningerne korrekt, kan testen udføres.
- Start lydoptageren og lad borgeren læse sætningslisten højt.

Transskription og scoring af testen

- Notér på registreringsarket under feltet, *Transskription*, hvilke ord du mener, at borgeren siger. Dvs.: Hvis du hører borgeren sige "Manden er særk", men forstår meningen som "Manden er stærk", skriver du "Manden er stærk".
- Under feltet, *Kommentarer*, kan du fx skrive, at borgeren undlader artikulation af /t/ i konsonantklyngen /st/. Fejlproduktion af ordene påvirker således ikke den endelige score, så længe at det ikke påvirker, hvilket ord logopæden opfatter at borgeren forsøger at udtrykke.
- Scor testen ved at sammenholde transskription med sætningslisten og notér, hvor mange ord du har forstået.